

ไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอน

สายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 แพร่เร็ว ติดง่าย

วัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนักได้!

สาเหตุของการ “แพร่เร็ว ติดง่าย”

BA.4 และ BA.5 คือสายพันธุ์ย่อยที่กลายพันธุ์มาจากไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ทำให้ไวรัสมีความสามารถในการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น หลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น จึงทำให้ติดเชื้อง่าย แม้จะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ หรือฉีดวัคซีนมาแล้วระยะหนึ่งก็อาจติดเชื้อได้

ข้อมูลผู้ติดเชื้อทั่วโลก

โดยฐานข้อมูลโลก GISAID จากตัวอย่างใน 62 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565)

BA.4 มีแนวโน้มผู้ป่วย ลดลง จาก 16% เหลือ 9%

BA.5 มีแนวโน้มผู้ป่วย เพิ่มขึ้น จาก 16% เป็น 25%

ประเทศไทยมีการระบาดของ BA.4 และ BA.5 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม “การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น” ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า... ช่วยให้มีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมทั้งลดความเสี่ยงของการป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น...

หากฉีดเข็ม 2 มาแล้ว ≥ 3 เดือน ควรฉีดวัคซีนเข็ม 3

หากฉีดเข็ม 3 มาแล้ว ≥ 4 เดือน ควรฉีดวัคซีนเข็ม 4

โดยเฉพาะ **กลุ่มเสี่ยงสูง** หากติดเชื้อมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยด่วน คือ กลุ่ม 608

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคเบาหวาน)

หญิงตั้งครรภ์
ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

“การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ ยังคงเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้”

จัดทำ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565