

เขียนโดย สำนักปลัด

วันที่ 03 สิงหาคม 2022 เวลา 08:54 น. - แก้ไขล่าสุด วันที่ 03 สิงหาคม 2022 เวลา 08:59 น.



แนวปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ
กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)
ฉบับที่ 31 กรกฎาคม 2565

โรคฝีดาษวานร (Monkey Pox)

- เชื้อสาเหตุ คือ variola virus พบในลิงในตระกูล Oldworld monkey, forest monkey
- โรคฝีดาษวานรเป็นโรคที่หายากและพบได้ สันนิษฐานว่าพบในลิงผู้เลี้ยงดูในคอกเลี้ยงลิงในสหรัฐอเมริกาและในทวีปแอฟริกา
- ระยะเวลารอคอยการเกิดโรคประมาณ 2 - 4 สัปดาห์
- เมื่อตรวจพบโรคฝีดาษวานร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องรีบแจ้งกรม สสส. แจ้งแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ระยะติดต่อ

7 - 21 วัน

จากกรณีการติดเชื้อ ผู้ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานร จะเริ่มมีอาการประมาณ 5-7 วันหลังจากสัมผัสกับเชื้อโรคหรือสัมผัสกับของใช้ของผู้ป่วยหรือสัมผัสกับของใช้ของผู้ป่วย

การติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีอาการแสดงของโรคฝีดาษวานร หรือสัมผัสกับของใช้ของผู้ป่วย หรือสัมผัสกับของใช้ของผู้ป่วย หรือสัมผัสกับของใช้ของผู้ป่วย

คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลโรคฝีดาษวานร (Monkey Pox) ฉบับที่ 31 กรกฎาคม 2565

1. ผู้ป่วย (suspected case) ที่ได้รับการวินิจฉัย
1) ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากห้องพัก และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากห้องพัก และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากห้องพัก
- 2) เมื่อผู้ป่วยมีอาการแสดงของโรคฝีดาษวานร ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากห้องพัก และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากห้องพัก

แนวปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkey Pox)
ฉบับที่ 31 กรกฎาคม 2565