

แนววิธีปราบ

ด้วงแรดมะพร้าว

ตัวทำลายสวนปาล์ม



การป้องกันกำจัด

ทำความสะอาด

- ทำความสะอาดบริเวณสวนปาล์ม เพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์



ใช้กับดัก

- ใช้กับดักฟีโรโมนล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย



ทำกองล่อ

- ทำกองปุ๋ยหมักขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร รดน้ำให้มีความชื้น เพื่อดึงตัวเต็มวัย มาวางไข่ หากพบหนอนด้วงแรดมะพร้าว ให้คลุกเชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา 1 กก./กอง ต่อพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อกำลายหนอน ด้วงแรดมะพร้าว



ใช้สารเคมี

- สำหรับปาล์มน้ำมันอายุ 1 - 5 ปี ใช้สารเคมี ไดอะซินอน 60% EC หรือ คาร์บาริล 85% WP ราดบริเวณคอปาล์มให้เปียกชุ่ม โดยใช้ประมาณ 1 - 1.5 ลิตร/ต้น ตามขนาดของคอปาล์มน้ำมัน ห่างกัน 15-20 วัน ทำ 1-2 ครั้ง



กรมส่งเสริมการเกษตร



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเกษตรจังหวัด

และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน