

# “โรคฉี่หนู”

โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

**โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน**  
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก



## การติดเชื้อ

- การสัมผัสปัสสาวะ หรืออวัยวะของสัตว์ติดเชื้อ
- เดินลุยน้ำ ลงแช่น้ำ ย่ำดินโคลน ที่มีเชื้อปนเปื้อน

## อาการของโรค

### อาการไม่รุนแรง

- ไข้สูงเฉียบพลัน
- ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
- ปวดกล้ามเนื้อ บริเวณน่อง โคนขา
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ตาแดง

### อาการรุนแรง

- ตาเหลือง ตัวเหลือง
- ไอ้มัลเลอตน
- กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- อาการตับวาย ไตวาย ทำให้เสียชีวิต

## สัตว์ที่เป็นพาหะ



โค กระบือ



สุกร



สุนัข



หนู

\*หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่องและโคนขา มีประวัติสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะ หรือลุยน้ำ 1-2 สัปดาห์ **ควรรีบพบแพทย์**

## วิธีป้องกัน



หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หากจำเป็นให้ใส่รองเท้าบูท



ดื่มน้ำต้มสุกและกินอาหาร ที่ปรุงสุกใหม่ ๆ



รักษาความสะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู



ล้างมือ ล้างเท้า ให้สะอาด

ที่มา : กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ : 9 ต.ค. 66

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายด่วนกรมควบคุมโรค : **1422**